

# #90 - CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO: ANÁLISIS DE 11 AÑOS DE INTERVENCIÓN ENDOSCÓPICA EN UN CENTRO TERCIARIO DE SANTIAGO DE CHILE.

<https://doi.org/10.46613/congastro2024-090>

Karen Andrea Hunt Pavesi<sup>1</sup>, Alberto Kyling Duvauchelle<sup>2</sup>, Camila Fernanda Barrientos Riveros<sup>3</sup>, Daniel Alejandro Cisternas Camus<sup>4</sup>, Kevin Cortés De Guzmán<sup>5</sup>, Luis Arnaldo Méndez Alcaman<sup>4</sup>

<sup>1</sup>CESFAM Juan Antonio Ríos, <sup>2</sup>Universidad Diego Portales/Hospital DIPRECA, <sup>3</sup>CESFAM Miguel Ángel Arenas López, <sup>4</sup>Clínica Alemana de Santiago, <sup>5</sup>Escuela de Química y Farmacia.

**Introducción:** La tasa de incidencia anual global de CEE es de 13 casos por cada 100.000 habitantes, con una tendencia creciente en los últimos años en adultos. La impactación por cuerpo extraño esofágico (CEE) requiere en el mayor porcentaje de casos que no ceden espontáneamente, intervención endoscópica de urgencia, siendo este procedimiento considerado el gold standard de manejo. La tasa de complicaciones asociadas es cercana al 1%. **Objetivo:** Responder a las preguntas de investigación: ¿Cuál es el perfil de los pacientes que consultan por CEE? ¿Son los tumores esofágicos o estenosis los hallazgos principales en pacientes que consultan por impactación por CEE? **Métodos:** Se utilizó una serie de casos de pacientes de 15 años o más que acudieron al Servicio de Urgencias de Clínica Alemana de Santiago (CAS) con sospecha o confirmación de impactación de CEE, entre los años 2008 y 2019. Se realizó análisis estadístico de antecedentes bio demográficos, hallazgos endoscópicos y complicaciones. **Resultados:** Se obtuvo una muestra de 324 casos con sospecha de CEE al ingreso a CAS. El promedio de edad fue de  $46.2 \pm 19.1$  años, siendo el 55,9% hombres. Los síntomas más frecuentes fueron sensación de cuerpo extraño (67,9%), sialorrea (35,4%) y dolor (28%). En 127 pacientes (39,1%) se identificó y se extrajo el CEE mediante endoscopia digestiva alta (EDA). De estos, el 44,1% no presentó hallazgos patológicos, seguido de un 37% con esofagitis eosinofílica, 22,8% con esofagitis erosiva y un 10,2% con estenosis esofágica. **Conclusión:** El perfil de pacientes que consulta en CAS corresponde predominantemente a hombres de mediana edad, y cuyos síntomas más frecuentes corresponden a globus, sialorrea y dolor local. A los pacientes que se les realiza EDA y se evidencia CEE, el mayor porcentaje no tiene hallazgos patológicos, sin embargo, la esofagitis eosinofílica y esofagitis erosiva son diferenciales que hay que tener en cuenta. La estenosis esofágica y los tumores no son los hallazgos más frecuentes.

