

31 USO DE FEXUPRAZAN EN EL TRATAMIENTO DE LA DISPEPSIA FUNCIONAL SUBTIPO DOLOR EPIGÁSTRICO: ESTUDIO ABIERTO PILOTO

congastro2025-31

von Mühlenbrock C^{1,2}, Pacheco N¹, Pérez JJ¹, Herrera K¹. ¹Centro de Enfermedades digestivas Clínica Universidad de los Andes. Departamento Medicina Interna. Universidad de los Andes. ²Sección Gastroenterología, Departamento Medicina. Hospital Clínico Universidad de Chile.

INTRODUCCIÓN

La dispepsia funcional (DF) es un trastorno frecuente intestino-cerebro, con síntomas persistentes sin causa estructural. Según Roma IV, se clasifica en dis-trés postprandial, dolor epigástrico y mixto. Su fisiopatología es multifactorial. Los tratamientos convencionales tienen eficacia limitada, especialmente en dolor epigástrico. Los PCABs, como vonoprazán, son prometedores pero aún carecen de evidencia en DF. OBJETIVO

Evaluar la eficacia y seguridad del fexuprazán en pacientes con dispepsia funcional subtipo dolor epigástrico atendidos en nuestro centro. METODOLOGÍA Estudio piloto abierto de 8 semanas en adultos con diagnóstico de dispepsia funcional dolor epigástrico (Roma IV). Los participantes recibieron 40 mg diarios de fexuprazán, con seguimiento telefónico cada 4 semanas. Se evaluó respuesta clínica (Likert), síntomas (PAGI-SYM), calidad de vida (PAGI-QoL), adherencia (Morisky y conteo de comprimidos) y efectos adversos. Se excluyeron pacientes con enfermedades estructurales, cirugías gástricas previas o uso reciente de neuromoduladores, probióticos o IBP. El análisis se realizó con SPSS v.29 usando prueba de Wilcoxon. RESULTADOS Se incluyeron 12 pacientes (8 mujeres), edad promedio 33 años. PAGI-SYM promedio disminuyó de 58,0 a 30,5 tras 8 semanas ($p = 0,02$). No hubo cambios relevantes en calidad de vida ni efectos adversos. La adherencia fue del 100%. CONCLUSIÓN El fexuprazán mostró eficacia, seguridad y buena tolerancia en DF dolor epigástrico. Estos resultados preliminares respaldan estudios controlados más amplios para confirmar su utilidad clínica.

