


39 RESPUESTA CLÍNICA A ACOTIAMIDA EN PACIENTES CON REFLUJO REFRACTARIO Y MOTILIDAD ESOFÁGICA INEFECTIVA

congastro2025-39

Squella F.^{1,2,3}, Bustos V.³, Orellana A.³.¹ Clínica Indisa, Santiago, Chile; ² CEDIF, Santiago, Chile; ³ Universidad Andrés Bello Santiago, Chile.

Introducción: La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es altamente prevalente. Un subgrupo presenta síntomas refractarios al tratamiento con inhibidores de bomba de protones (IBP), lo que obliga a considerar otros mecanismos. Entre ellos destaca la motilidad esofágica inefectiva (IEM), trastorno motor frecuente en la manometría de alta resolución, asociado a disfagia y mala respuesta al tratamiento estándar. La acotiamida, procinético inhibidor de la acetilcolinesterasa, ha mostrado beneficios en la contractilidad esofágica y la mejoría sintomática. **Objetivo:** Evaluar la respuesta clínica a acotiamida en pacientes con ERGE refractario e IEM. **Métodos:** Serie prospectiva en 15 pacientes adultos con ERGE y disfagia (edad media 46,1±10,9 años). Todos presentaron IEM. Se mantuvo IBP más acotiamida 100 mg tres veces al día por 8 semanas. Se evaluaron GERD-Q, eructos y EAT-10 al inicio y al final. **Resultados:** Hubo mejoría significativa en todas las variables. GERD-Q: 13.0±1.2 a 5.1±1.0 (? -7.9; IC95% -8.4 a -7.4; p<0.0001). Eructos: 4.6±1.0 a 3.9±0.8 (? -0.6; IC95% -0.9 a -0.4; p=0.0003), con significancia estadística aunque menor relevancia clínica. EAT-10: 12.4±2.2 a 4.6±1.1 (? -7.9; IC95% -8.7 a -7.0; p<0.0001). El 100% logró reducción >50% en EAT-10 y el 14% alcanzó <3 puntos. **Conclusiones:** La acotiamida, asociada a IBP, produjo una mejoría en los puntajes de GERD-Q y EAT-10, y una reducción en los eructos. Estos hallazgos respaldan su potencial como terapia adyuvante en pacientes con ERGE refractario y motilidad esofágica inefectiva.

Reducción de puntajes pre y post tratamiento con Acotiamidic



Especialidad del resumen

Gastroenterología adulto



Subespecialidad del resumen

Neurogastroenterología

Tabla 1. Resultados pre y post-tratamiento con acotiamida

Variable	Pre (media±DE)	Post (media±DE)	Δ media [IC95%]	p (t pareado)
GERD-Q	13.0 ± 1.2	5.1 ± 1.0	-7.9 [-8.4, -7.4]	<0.0001
Eructos	4.6 ± 1.0	3.9 ± 0.8	-0.6 [-0.9, -0.4]	0.0003
EAT-10 (Disfagia)	12.4 ± 2.2	4.6 ± 1.1	-7.9 [-8.7, -7.0]	<0.0001