

60 “VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE LAS ESCALAS ESPECÍFICAS PARA EVALUACIÓN DE DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES CON ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES; EN HOMBRES [EII-EEDM] Y EN MUJERES [EII- EEDF]”.

congastro2025-60

Chelech F.¹, Zurita A.^{2a}, San Martín P.³, Pedraza A.⁴, Núñez P.², Pizarro G.², Flores L.^{2b}, Quera R.².

¹Servicio de Gastroenterología Clínica las Condes-Hospital del Salvador, ²Universidad de los Andes, Programa de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Clínica Universidad de los Andes. ³Didep y IMPACT, Clínica Universidad de los Andes. Centro de Investigación e Innovación Biomédica, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. ⁴Residente de Gastroenterología Universidad de los Andes. ^aResidente de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ^bEnfermera.

INTRODUCCIÓN: La disfunción sexual (DS) puede presentarse en un 20-90% de los pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Para su evaluación existen cuestionarios validados para la población general, el índice para evaluar DS en hombres (IIEF) y para mujeres (FSFI). **OBJETIVO:** Validar psicométricamente, para la población hispanoparlante residente en Chile, las escalas de evaluación de DS específicas para pacientes con EII, EII-escala específica de disfunción masculina (EII- EEDM) y EII-escala específica de disfunción femenina (EII-EEDF). **MÉTODOS:** Estudio prospectivo, observacional de corte transversal, que incluyó pacientes con EII, >18 años, que refirieran tener actividad sexual y hayan sido evaluados entre marzo- agosto 2025 en el Programa de EII. Se evaluó el uso de escalas para DS en mujeres, FSFI y EII-EEDF, y en hombres, IIEF y EII- EEDM. **RESULTADOS:** Se evaluaron 154 pacientes, 60% mujeres, mediana de edad 43 años, 46% estaban casados, 67% con colitis ulcerosa y 13% con calprotectina fecal >250 pg/g. El 33% de las mujeres vs 16.4% de los hombres, refirió tener alguna patología psiquiátrica. La DS se presentó en el 62.3 y el 66.7% al utilizar las escalas IIEF y FSFI respectivamente. La consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach, para EII-EEDM y EEDF fue de 0,914 y 0,946 para hombres y mujeres respectivamente. **CONCLUSIONES:** Nuestros resultados muestran que la presencia de DS es frecuente en pacientes con EII. Los índices EII-EEDM y EEDF resultan ser instrumentos factibles de utilizar en esta población, siendo comparables con los gold estándar, IIEF-FSFI.

