

89 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA TRANSANAL MÍNIMAMENTE INVASIVA (TAMIS) EN TUMORES RECTALES

congastro2025-89

Jaimes J.², Silva C.², Gutierrez I.², Wainstein C.¹, Marin D.¹, Lopez F.^{1,1} Servicio de cirugía, Clínica Universidad de los Andes, Santiago de Chile, Chile; ² Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Santiago de Chile, Chile.

INTRODUCCIÓN: La resección transanal clásica, ha sido desplazada por el acceso mínimamente invasivo, el cual permite alcanzar tumores rectales más proximales y extirpar la pieza en block con mayor tasa de márgenes negativos. La principal indicación es la resección de tumores de recto medio y bajo, y en particular frente a la sospecha de cáncer invasor hasta la submucosa (pT1). **OBJETIVO:** Analizar los resultados con la técnica TAMIS en tumores de recto medio y bajo. **MATERIAL Y MÉTODO:** Estudio transversal, retrospectivo, basado en la revisión de fichas clínicas de pacientes sometidos a TAMIS con tumores de recto medio y bajo en la Clínica Universidad de los Andes entre enero de 2022 y diciembre 2024. **RESULTADOS:** Se incluyeron 19 pacientes, edad promedio 63 años; 58% mujeres, con tumores rectales a una distancia media de 6,6 cm del margen anal y tamaño promedio de 2,5 cm. El tiempo operatorio medio fue de 37 minutos. El 90% de los pacientes fue dado de alta dentro de las primeras 24 horas. Se registraron dos complicaciones Clavien -Dindo grado I (11%). Se resecaron 10 lesiones benignas y 9 malignas, logrando resección completa en bloque con margen negativo en todos los casos. En el seguimiento promedio de 26 meses, el 95% de los pacientes se encuentran sin evidencia de recurrencia local ni a distancia.

CONCLUSIÓN: TAMIS puede ser un procedimiento curativo en tumores benignos y en cáncer invasor pT1, disminuyendo los riesgos asociados a cirugías radicales.

